

INDIKATOROMRÅDE	INDIKATORER	TYPE	STANDARD OG TIDSRAMME
1. Komplethedegraden af indberetninger	Andel af henholdsvis primær total hoftealloplastik operationer og revisioner som indberettes til DHR.	Proces	90%
2. Farmakologisk behandling	Andel af primær total hoftealloplastik operationer eller revisioner, hvor der gives profylaktisk antibiotisk og antitrombotisk behandling.	Proces	≥ 98 % af patienterne skal have farmakologisk behandling i forbindelse med operation.
3. Peroperative komplikationer	Andel af primær total hoftealloplastik operationer med peroperative komplikationer.	Resultat	< 5 % af patienterne må få peroperative komplikation
4. Implantatoverlevelse	4a. Andel af alle primær total hoftealloplastik proteser som ikke er revideret uanset årsag. 4b. Andel af primær total hoftealloplastik proteser hos patienter med primær artrose som ikke er revideret uanset årsag. 4c. Andel af primær total hoftealloplastik proteser hos patienter med primær artrose som ikke er revideret på grund af aseptisk løsning.	Resultat	Lands gennemsnit
5. Reoperation	Andel af alle patienter med primær total hoftealloplastik som reopereres på grund af dyb infektion, luksation eller femurfraktur i samme hofte inden for 3 måneder efter dato for primær total hoftealloplastik.	Resultat	< 1 % af patienterne med en primær total hoftealloplastik må re-opereres (dvs. med eller uden udskiftning af protesekomponenterne) på grund af dyb infektion, luksation eller femur fraktur i den samme hofte indenfor 3 måneder efter dato for primær total hoftealloplastik.
6. Genindlæggelse	Andel af alle patienter med primær total hoftealloplastik som genindlægges på grund af problemer* med den opererede hofte inden for 3 måneder efter dato for primær total hoftealloplastik.	Resultat	< 5 % af patienterne med en primær total hoftealloplastik må genindlægges pga. problemer (reoperation med eller uden udskiftning af protesekomponenterne og/eller indlæggelse uden der er foretaget en ny operation på hofte, f.eks. lukket reposition pga. luksation i hofte) med den opererede hofte indenfor 3 måneder efter operation.

5. LPR koder for reoperation: KNFH22, KNFW59, KNFW69, KNFJ, KNFC20, KNFC21, KNFC22, KNFC29, KNFC30, KNFC31, KNFC32, KNFC39, KNFC40, KNFC41, KNFC42, KNFC49, KNFC59, KNFC99

6. * Ved problemer forstås kombination af følgende diagnosekoder fra Landspatientregister: mekaniske komplikationer (T84.0), infektion i hofte (T84.5), Andet specifik komplikation i hofte (T84.8) og følgende operationskoder: reposition af implant (både lukket og åben) (NFH20, NFH22), reoperation pga. overfladisk eller dyb infektion (NFW59, NFW69), og re-alloplastik (NFC20-22, NFC29, NFC30-32, NFC39, NFC40-42, NFC49, NFC59, NFC99).